

УТВЕРЖДЕНО

приказом Минздрава России

от 30.12.2003 г. N 621

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ)

Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы	Группа здоровья	Примечания
1	3	4
пороки сердца: врожденные приобретенные	III, IV, V	В зависимости от компенсации (степени недостаточности кровообращения) - при отсутствии недостаточности кровообращения - III - при недостаточности кровообращения 1 ст. - IV; - при недостаточности кровообращения в ст. более 1 - V.
миокардит неревматической этиологии	III, IV, V	При полной клинической ремиссии - III, при неполной клинической ремиссии - IV, V
блокады сердца: - предсердно-желудочковые блокады 1 ст. - предсердно-желудочковые блокады II - III ст.; - внутрижелудочковые блокады	II, III, IV, V	- II; - при наличии синкопе III - V - III - V
артериальная гипертензия	III, IV, V	- средние уровни САД и или ДАЛ равные или превышают значение 95-го перцентиля для данного пола, возраста и роста - III, IV, - при появлении сердечной недостаточности - V
синдром нарушения кишечного всасывания	II, III, IV, V	вторичного характера - II; первичного характера в зависимости от тяжести течения - III, IV, V
хронический гепатит	III, IV, V	вне обострения - III, при обострении в зависимости от тяжести - IV, V

Органы дыхания		
хронический бронхит, простой слизисто-гнойный, обструктивный, эмфизематозный, неуточненный	III, IV, V	в зависимости от компенсации (степени дыхательной недостаточности) и частоты обострений: -1-4 раза в г. - III; -5-6 раз в г. - IV
Астма бронхиальная	III, IV, V	при полной клинической ремиссии - III; при неполной клин. ремиссии - IV В зависимости от компенсации (по клиническим и функциональным показателям, данным аллергологического обследования): - при легком течении - III, - при среднетяжелом течении - IV; - при тяжелом течении - IV или V; - при гормональной зависимости - V.
бронхоэктатическая болезнь	III, IV, V	в зависимости от компенсации (степени дыхательной недостаточности)
отосклероз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (в том числе кохлеарный неврит и др.) потеря слуха неуточненная (в т.ч. глухота на оба уха)	III, IV, V	в зависимости от степени потери слуха: - шепотная речь слышна на расстоянии более 3 метров - III; - шепотом речь слышна на расстоянии от 1 до 3 метров- IV; - шепотная речь не слышна - V
детский церебральный паралич	III, IV, V	в зависимости от выраженности симптоматики и степени компенсации III, IV, V
гломерулярные болезни (гломерулонефрит)	III, IV, V	при полной ремиссии- III; при активности и снижении функции почек - IV; в стадии хронической почечной недостаточности - V
тубулоинтерстициальные болезни (пиелонефрит хронический - первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.)	III, IV, V	при полной ремиссии- III; при активности и при снижении функции почек - IV; в стадии хронической почечной недостаточности - V
врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей	III, IV, V	при сохранных функциях почек - III; при снижении функции почек -IV; в стадии хронической почечной недостаточности - V
мочекаменная болезнь	III, IV, V	при сохранных функциях почек - III; при снижении функции почек -IV; в стадии хронической почечной недостаточности - V

Примечание: в настоящую схему включены не все функциональные нарушения и хронические заболевания, встречающиеся в детском (в том числе подростковом) возрасте. В данный перечень вошли наиболее часто диагностируемые нарушения здоровья и развития.